MINISTERE de l'AGRICUITURE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

BULLETIN TECHNIQUE DE LA

DAVERUSSENENIS SMANION AGRICOLES

DU LANGUEDOC - ROUSSILLON MONTPELLIER - 16, rue de la République - Tél.72.58.72

Amer année

Troisième et quatrième édition nº 2


28 Mars 1956

AVERTISSEMENTS


TAVELURE du POIRIER


ZOnes III & IV

Les poiriers dont les bourgeons ont atteint ou dépassé le stade D doivent être protégés contre les attaques possibles de la maladie. Les périthèces arrivent à maturité dans certaines situations, ailleurs on observe des conidies en grand nombre.









Dès réception du présent avis, traiter avec l'un des produits ci-dessous énumérés :

- Bouillie Bordelaise

- Sulfate basique de cuivre

- Zinèbe

- Zirame

- Oxychlorure de cuivre

- Captane

- Ferbame

- Thirame

MONILIA de l'ABRICOTIER

Zones III & IV

Les pluies abondantes qui se sont récemment produites imposent le renouvellement du traitement.

INFORMATION

C

CERISIER

Zones III & IV

GNOMONIA - MONILIA - TEIGNE - Il est conseillé de faire, dès maintenant, une pulvérisation anticryptogamique et insecticide avec :

- Bouillie Bordelaise - Oxychlorure de cuivre - Sulfate basique de cuivre

) mélangé à (H.C.H. D.D.T.

Dans le cas où des éclatements des écorces ont été provoqués sur les troncs, par le gel, il est prudent, pour éviter des effets néfastes de l'insolation, de procéder au blanchiment des troncs tout au moins sur les parties des troncs exposées à l'est, au sud et au sudouest.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux, P. BERVILLE .

Le Contrôleur chargé des DLP 5-4-56 036752L.L.TROUILLON Avertissements Agricoles,

Imprimé à la Station d'Avertis. Agric. du Languedoc - Roussillon; 16 rue de la République, Montpellier. Le Gérant La TROUILLON , Autor du 6 Mars 56. Reproduction, adaptation réservées.